



Ocena prawdopodobieństwa klinicznego zakrzepicy żył głębokich ZŻG (skala Wellsa)

Aktywny nowotwór, aktywne leczenie paliatywne w ciągu ostatnich 6 miesięcy	+1
Porażenie/niedowład lub niedawne unieruchomienie kończyn dolnych	+1
Niedawne unieruchomienie trwające > 3 dni lub poważny zabieg operacyjny w ciągu ostatnich 3 miesięcy	+1
Miejscowa tkliwość/ból wzdłuż przebiegu żył głębokich	+1
Obrzęk całej kończyny dolnej (należy zmierzyć obwód)	+1
Obrzęk podudzia >3 cm w porównaniu do strony bezobjawowej (mierzony 10 cm poniżej guzowatości kości piszczelowej)	+1
Obrzęk ciastowaty kończyny z podejrzeniem zakrzepicy	+1
Poszerzenie żył powierzchownych w kończynie z podejrzeniem zakrzepicy (nie żylaki)	+1
Udokumentowana przebyta wcześniej zakrzepica żył głębokich	+1
Alternatywne potwierdzone lub bardzo prawdopodobne rozpoznanie inne niż zakrzepica żył głębokich	-2
Suma:	



Wynik	Prawdopodobieństwo ZŻG	Prawdopodobieństwo ZŻG	Odsetek pacjentów
≥3	Wysokie	ok. 85%	ok. 20%
1-2	Średnie	ok. 33%	ok. 35%
≤0	Niskie	ok. 5%	ok. 4-5%

Źródła: Wells PS, Anderson DR, Bormanis J, et al. Value of assessment of pretest probability of deep-vein thrombosis in clinical management. Lancet 1997; 50:1795.

Wells PS, Anderson D, Rodger M et al. Evaluation of D-dimer in the diagnosis of suspected deep-vein thrombosis. N Eng J med 2003; 349: 1227-35.

Wells PS. Integrated strategies for the diagnosis of venous thromboembolism. J Thromb Haemost 2007; 5 (suppl. 1): 41-50.