



Stopnie kontroli astmy u dzieci > 5 roku życia i młodzieży (wg GINA 2023)²

Stopnie kontroli astmy		Astma dobrze kontrolowana	Astma częściowo kontrolowana	Astma niekontrolowana
Oceniane kryteria				
Ocena spełnienia kryteriów - w ostatnich 4 tygodniach	• Objawy w ciągu dnia > 2 razy w tygodniu • Brak nocnych przebudzeni z powodu astmy • Stosowanie leków na żądanie > 2 razy w tygodniu • Brak Ograniczeń aktywności życiowej z powodu astmy	Nie jest spełnione żadne kryterium	Spełnione 1–2 kryteria	3 – 4 spełnione kryteria

Źródło: 2023 GINA Report, Global Strategy for Asthma Management and Prevention <https://ginasthma.org/2023-gina-main-report/> (dostęp 12.04.2024)

Stopnie kontroli astmy u dzieci ≤ 5 oku życia (wg GINA 2023)²

Stopnie kontroli astmy		Astma dobrze kontrolowana	Astma częściowo kontrolowana	Astma niekontrolowana
Oceniane kryteria - występowanie w ostatnich 4 tygodniach	- Objawy dzienne trwające powyżej kilku minut częściej niż 1 x/tydzień - Objawy pojawiają się przy wysiłku fizycznym. Ograniczenie aktywności ruchowej, łatwe męczenie z powodów oddechowych - Leki doraźne częściej niż 1 x/tydzień - Nocne przebudzenia z powodu objawów astmy lub nocny kaszel	Nie jest spełnione żadne kryterium	Spełnione 1 - 2 kryteria	3 - 4 spełnione kryteria

¹ Kryterium nie ma zastosowania do pacjentów zapobiegawczo przyjmujących lek przed wysiłkiem ² oraz w wieku 12 lat i starszych, którzy stosują tylko stałą kombinację (małe dawki ICS i formoterol) w razie potrzeby w stadium 2: W przypadku dobrze kontrolowanej astmy stała kombinacja nie jest stosowana częściej niż dwa razy w tygodniu.^{1,2}