

Limfadenopatia: wskazówki dotyczące przyczyny

Objawy podmiotowe lub przedmiotowe	Możliwe podejrzenia diagnozy
• Gorączka • Nocne poty • Ubytek masy ciała • Powiększone węzły chłonne: nadobojczykowe, podkolanowe, pachowe lub pachwinowe • Krwiaki • Powiększenie śledziony	➤ Białaczka ➤ Chłoniak ➤ Przerzuty nowotworowe
• Gorączka • Dreszcze • Osłabienie • Zaczerwienione gardło • Nudności • Wymiotowy • Biegunka • Brak innych znaków ostrzegawczych	➤ Bakteryjne lub wirusowe zapalenie gardła/ dróg oddechowych ➤ Zapalenie wątroby ➤ Grypa ➤ Mononukleozę ➤ Gruźlica (w przypadku odpowiedniej ekspozycji) ➤ Różyczka
• Ryzykowne zachowania seksualne	➤ Wrzód miękkiej (Ulcus molle) ➤ Zakażenie wirusem HIV ➤ Ziarnica weneryczna pachwin (Lymphogranuloma venereum) ➤ Kiła

• Kontakt ze zwierzętami lub spożycie mięsa: ○ Koty ○ Zające, owce, bydło i ich włosy, futro lub wełna ○ Niedogotowane mięso	➤ Choroba kociego pazura (Bartonella) ➤ Toksoplazmoza ➤ Wąglik, ➤ Bruceloza ➤ Tularemia
• Podróż za granicę	➤ Podejrzenie rozpoznania według regionu endemicznego (patrz także artykuł Gorączka u powracających z krajów tropikalnych)
• Bóle stawów • Rumień • Sztywność stawów • Gorączka • Dreszcze • Ograniczenie ruchomości w stawach	➤ Reumatoidalne zapalenie stawów ➤ Zespół Sjögrena ➤ Zapalenie skórno-mięśniowe ➤ Toczeń rumieniowaty

Źródło: Zmodyfikowano z Gaddey HL, Riegel AM. Niewyjaśniona limfadenopatia: ocena i diagnostyka różnicowa. Am Fam Physician 2016; 94: 896-903.