

Zespół Sjögrena, algorytm diagnostyczny

Badanie przesiewowe
Suchość oczu >3 miesiące Suchość w jamie ustnej >3 miesiące
Diagnostyka podstawowa
Ocena wytwarzania śliny bez stymulacji Ocena wydzielania łez (Test Schirmera) Ocena uszkodzenia rogówki (test fluorescencyjny) Przeciwciała anty- Ro (SS-A) / La (SS-B) Biopsja gruczołu ślinowego (limfocytarny naciek zapalny ≥ 1)
Rozszerzona diagnostyka (w zależności od obrazu klinicznego lub ESSDAI)
USG/scyntygrafia ślinianek Ocena funkcji płuc (PFT), tomografia komputerowa o wysokiej rozdzielczości (HRCT), 6-minutowy test marszowy RM czaszki, elektromiografia (ENMG), badanie płynu mózgowo-rdzeniowego (CSF) Uwaga: Chłoniak nieziarniczy? U kobiet ciężarnych: Uwaga: wrodzony blok serca płodu?

ANA = przeciwciała przeciwjądrowe; ENMG = elektroneuromia; ESSDAI, EULAR = wskaźnik aktywności choroby zespołu Sjögrena; HRCT = tomografia komputerowa wysokiej rozdzielczości; LuFu = Diagnostyka czynności płuc

Źródła: Stefański AL, Tomiak C, Pleyer U, Dietrich T, Burmester GR, Dörner T: Diagnostyka i terapia zespołu Sjögrena. Dtsch ärzteblatt int 2017; 114(20): 354-61.