

Racjonalna antybiotykoterapia w praktyce lekarza rodzinnego: doustna terapia z wyboru zgodnie z aktualnymi wytycznymi

	Penicylina fenoksymetylowa	Amoksylicyna	Amoksylicyna/kwas	Erytromycyna	Klarytromycyna	Azytromycyna	Cefalosporyna I gen.	Cefalosporyna II gen.	Cefalosporyna III gen.	Doksylicyna	Kotrimoksazol	Aminoglikozyd	Cyprofloksacyna	Moksifloksacyna	Lewofloksacyna	Fosfomycyna	Furazydyna	Nitroksolina	Metronidazol	Klindamycyna
Górne drogi oddechowe																				
Paciorkowcowe zapalenie gardła	++				++*	++*	++													
Płonica	++				++*	++*	++													
Zapalenie ucha środkowego		++	+		++*			++												
Zapalenie zatok przynosowych		++	+		++*	++*		++												
Dolne drogi oddechowe																				
Zapalenie oskrzeli																				
PZP, lekkie		++	+		++	++								+	+					
PZP + choroby współistniejące			++					++						+	+					
Atypowe PZP				++	++	++				+				+	+					
PZP u dzieci		++	+		+	+		+												
Krztusiec					++	++				+	+									
Drogi moczowe																				
Niepowikłane zapalenie pęcherza											++					++	++	++		
Zapalenie pęcherza w ciąży		++	++					++								++ ^a				
Zapalenie pęcherza u dzieci							+	+			++					++	++			
OOZN			+					+			++		++		++					
OOZN u dzieci			++					++	++			++	++ ^b							
Układ pokarmowy																				
Zapalenie uchyłków			++										#						#	
Skóra/tkanki miękkie																				
Róża	++						++													++
Zapalenie tkanki łącznej (lekki przebieg)	++						++	++			+									+

++ leczenie pierwszego rzutu

+ leczenie drugiego rzutu

*I rzut tylko w przypadku nadwrażliwości na beta-laktamy

^a kategoria B w ciąży

^b zgodnie z ograniczeniami wiekowymi

w skojarzeniu z innym lekiem