



Tabela ekwiwalentnych, dobowych dawek wziewnych kortykosteroidów (ICS) u dzieci i młodzieży

Substancja czynna	Niska dawka (µg)		Średnia dawka (µg)		Wysoka dawka (µg)	
	Dzieci < 12 lat	Nastolatki 12–18 lat	Dzieci < 12 lat	Nastolatki 12–18 lat	Dzieci < 12 lat	Nastolatki 12–18 lat
Dipropionian beklometazonu (DPI)*	100 - 200	200 - 500	200 - 400	500 - 1000	> 400	> 1000
Dipropionian beklometazonu (pMDI)**	50 - 100	100 - 200	100 - 200	200 - 400	> 200	> 400
Budezonid	100 - 200	200 - 400	> 200 - 400	> 400 - 800	> 400	> 800
Budezonid nebulizacja***	250 - 500	–	500 - 1000	–	> 1000	–
Cyklezonid#	–	80 -160	–	> 160 - 320	–	> 320
Propionian flutykazonu##	50 - 100	100 - 250	> 100 - 200	> 250-500	> 200	> 500

*> 5 r.ż.; **> 6 r.ż.; *** >6 m.ż.; # w Polsce rejestracja >12 r.ż.; ##pMDI >12 m.ż., DPI- dysk > 4 r.ż.,

pMDI-inhalator ciśnieniowy (ang. metered-dose inhaler), DPI- inhalator suchego proszku (dry powder inhaler), Tabela nie jest instrukcją dawkowania; zawiera informacje o tym, które dawki poszczególnych składników aktywnych należą do którego zakresu dawkowania i ma na celu pomóc w przejściu z jednego składnika aktywnego na inny.

Źródło: 2023 GINA Report, Global Strategy for Asthma Management and Prevention <https://ginasthma.org/2023-gina-main-report/> (dostęp 12.04.2024) <https://indeks.mp.pl/>