

Tabela 1C. Testy przesiewowe – wizyta bilansowa 3 – 4. miesiąc życia

Rodzaj testu (oceniany obszar)	Ocena wyniku testu, uwagi
Rozwój fizyczny	
Pomiar długości ciała	Do około 18 miesiąca życia pomiar wykonywany jest w pozycji leżącej za pomocą sprzętu do pomiaru długości ciała (taweczka Epsteina, listwa pomiarowa z podziałką). <u>Dodatni test:</u> ✓ < 10. centyla – niedobór długości/ wysokości ciała niskorosłość ✓ > 97. centyla – wysokorosłość
Pomiar masy ciała	U niemowląt z dokładnością do 10 g.
Pomiar obwodu głowy	Średni wynik z dwóch pomiarów z dokładnością do 1 mm. <u>Dodatni test:</u> ✓ < 10. centyla – podejrzenie małogłowie ✓ > 97. centyla – podejrzenie wielkogłowie
Narząd słuchu	
Sprawdzenie wyniku badania przesiewowego słuchu po urodzeniu dziecka. Ocena obecności czynników ryzyka niedosłuchu w późniejszym wieku oraz nabytego uszkodzenia słuchu (tab. 3).	
Ocena zachowań słuchowych	<u>Prawidłowe reakcje słuchowe:</u> bezruch, pobudzenie ruchowe lub odwracanie głowy w odpowiedzi na dźwięk np. pochodzący od zabawki. <u>Dodatni test, obecne:</u> ✓ czynniki ryzyka wymienione w tab. 2. i/ lub ✓ czynniki ryzyka wymienione w tab. 3. i/ lub ✓ nieprawidłowe reakcje słuchowe ✓ niepokój rodziców dotyczący reakcji dziecka na bodźce słuchowe
Narząd wzroku	
Przezierność ośrodków optycznych	<u>Dodatni test:</u> ✓ brak odbłasku z dna oka, ✓ szare zmiany w obszarze czerwonego odbłasku,

	✓ biały odblask <i>(odblask z dna oczu powinien być czerwony i jednolity w obu oczach; badanie wykonywane od ukończenia 2 tygodnia życia i powtarzane w każdym wieku oraz zawsze, gdy rodzice zgłaszają niepokój).</i>
Test Hirsberga w kierunku wykrywania zeza	<u>Dodatni test:</u> ✓ asymetryczne ułożenie odblasków rogówkowych
Narząd ruchu	
Wykrywanie rozwojowej dysplazji stawu biodrowego	<u>Dodatni test (konieczna konsultacja ortopedy):</u> ✓ obecny objaw Barlowa ✓ obecny objaw Ortolaniego ✓ odwodzenie kończyn w stawie biodrowym ograniczone do kąta < 60 stopni ✓ odwodzenie kończyn w stawach biodrowych – asymetria <i>(objawy o mniejszym znaczeniu: nierówność fałdów udowych, pachwinowych, pośladkowych, nierówność kończyn dolnych przy zgięciu w stawach biodrowych i kolanowych).</i>
Układ moczowo - płciowy	
Obecność jąder w mosznie	<u>Określenie:</u> ✓ obecności ✓ wielkości (porównywalna obustronnie) ✓ konsystencji jąder <u>Dodatni test:</u> ✓ stwierdzenie niezstąpionego jądra/jąder > 6 miesiąca życia <i>(samoistne zstępowanie jąder następuje w pierwszych 3- 6 miesiącach życia, optymalny wiek zabiegowego sprowadzenia jąder- 12-18 miesiąc życia).</i>
Wady	• Spodziectwo

Źródło: opracowanie własne.