

Tabela 3. Czynniki ryzyka ujawnienia się niedosłuchu w późniejszym wieku oraz nabytego uszkodzenia słuchu

Czynniki ryzyka ujawnienia się niedosłuchu w późniejszym wieku:
➤ Dodatni wywiad rodzinny w kierunku niedosłuchu
➤ Rozszczep podniebienia
➤ Zespół Downa
➤ Mechaniczna wentylacja > 7 dni
➤ Infekcja noworodkowa z grupy TORCH lub wewnątrzmaciczna
Czynniki ryzyka nabytego uszkodzenia słuchu:
➤ Nawracające zapalenia ucha środkowego
➤ Przyjmowanie leków ototoksycznych
➤ Uraz akustyczny, nadwrażliwość słuchowa, szumy uszne
➤ Długotrwałe zmiany wysiękowe w uchu środkowym
➤ Przerost i przewlekłe zapalenie migdałków
➤ Wada wymowy wymagająca leczenia foniatrycznego lub logopedycznego
➤ Choroby zakaźne wieku dziecięcego o ciężkim przebiegu
➤ Zaburzenia neurologiczne lub psychiczne (np. mózgowie porażanie dziecięce, wodogłowie, psychoruchowe opóźnienie rozwojowe, autyzm)
➤ Zaburzenie metaboliczne, genetyczne lub hormonalne (np. cukrzyca, choroby spichrzeniowe, niedoczynność tarczycy/ przynależność, niewydolność nerek)
➤ Alergiczny nieżyt nosa
➤ Zabiegi chirurgiczne z przedłużoną mechaniczną wentylacją
➤ Niepokój rodziców dotyczący stanu słuchu lub rozwoju mowy