

Objawy podmiotowe i przedmiotowe bólu neuropatycznego

Objawy negatywne	
Niedoczulica	Zmniejszona wrażliwość na bodźce niebolesne (np. pocieranie wacikiem)
Hipoalgezia	Zmniejszona wrażliwość na bodźce bólowe (igła jednorazowa lub sztywne włókno von Freya)
Zmniejszone czucie wibracji (<i>pallhypoaesthesia</i>)	Zmniejszone czucie wibracji (badanie kamertonem przystawionym w okolicy nad kością)
Hipoestezja termiczna	Zmniejszona wrażliwość na zimne lub ciepłe bodźce (kontakt z zimnymi [10°C] i gorącymi [45°C] przedmiotami)

Objawy pozytywne	
Ból lub wrażenia samoistne	
Parestezje	Niebolesne, uporczywe nieprzyjemne odczucia (drętwienia, mrowienia)
Ból napadowy	Kłujące, podobne do rażenia prądem napady bólu (typowo trwają kilka sekund)
Ból powierzchowny	Uporczywe odczucia bólowe, często o charakterze pieczenia
Ból wywołany	
Allodynia	Ból spowodowany przez bodziec, który w normalnych warunkach jest niebolesny np. dotyk; dotknięcie wacikiem powoduje ostry, palący ból, który może rozprzestrzenić się na nienaruszone obszary
Hiperestezja	Niewielki nacisk na skórę lub kości powoduje ból
Hiperpatia	Łagodne powtarzające się bodźce prowadzą do wywołania ostrego, powierzchownego bólu, który może się rozprzestrzeniać i utrzymywać po zaprzestaniu działania bodźca
Hiperalgezja, ciepło	Kontakt skóry z ciepłym przedmiotem wywołuje palący/piekący ból
Hiperalgezja, zimno	Kontakt skóry z zimnym przedmiotem wywołuje palący/piekący ból