



Cecha M w czerniaku (AJCC 2016/UICC 2016)

Cecha M	Lokalizacja anatomiczna	Wartość LDH
M	Brak dowodów na odległe przerzuty.	
M1	Obecność odległych przerzutów.	
M1a	Odległe przerzuty do skóry, tkanki podskórnej, w tym mięśni i (lub) nieregionalnych węzłów chłonnych.	nieokreślone lub nieudokumentowane
M1a (0)		normalny
M1a (1)		podwyższona
M1b	Odległe przerzuty do płuc; z udziałem lub bez udziału lokalizacji zakodowanych w M1a.	nieokreślone lub nieudokumentowane
M1b (0)		normalny
M1b (1)		podwyższona
M1c	Odległe przerzuty w innych narządach trzewnych BEZ zajęcia OUN; z udziałem lub bez udziału lokalizacji zakodowanych pod M1a i M1b.	nieokreślone lub nieudokumentowane
M1c (0)		normalny
M1c (1)		podwyższona



Cecha M w czerniaku (AJCC 2016/UICC 2016)

Cecha M	Lokalizacja anatomiczna	Wartość LDH
M1d	Odległe przerzuty z zajęciem OUN; z udziałem lub bez udziału lokalizacji zakodowanych pod M1a, M1b lub M1c.	nieokreślone lub nieudokumentowane
M1d (0)		normalny
M1d (1)		podwyższona

Źródło: Wytyczne S3 dotyczące diagnostyki, terapii i opieki pooperacyjnej nad czerniakiem. Nr rejestru AWMF 032/0240L. Stan na 2018 r.