

Skala HAS-BLED: ryzyko krwawienia u pacjentów z migotaniem przedsionków

Parametry kliniczne		Punktacja
Nadciśnienie tętnicze (niekontrolowane)	Ciśnienie skurczowe >160 mmHg	1
Nieprawidłowa czynność nerek	Przewlekła dializoterapia, stan po przeszczepieniu nerki, kreatynina >200 $\mu\text{mol/l}$	1
Nieprawidłowa czynność wątroby	Marskość wątroby, bilirubina >2x ggn, AST/ALT/GGTP >3x ggn	1
Udar mózgu	Niedokrwieny lub krwotoczny udar mózgu w wywiadzie	1
Tendencja do krwawień	Poważne krwawienie w wywiadzie (np. krwotoczny udar mózgu) lub predyspozycja do krwawień (np. skaza krwotoczna)	1
Niestabilne wartości INR	TTR <60% przy leczeniu VKA	1
Podeszły wiek	>65 lat	1
Leki lub alkohol	NLPZ/ASA, alkohol >14 j. tygodniowo	1 lub 2
Suma punktów	≥ 3 punkty – duże ryzyko krwawienia	

Suma punktów	Roczne ryzyko poważnego krwawienia w %
0	1,13
1	1,02
2	1,88
3	3,74
4	8,70
5	12,50