

Nadciśnienie: leczenie hipotensyjne – główne oraz dodatkowe grupy leków

Główne grupy leków hipotensyjnych i przykładowe substancje	
Diuretyki tiazydowe/tiazydopodobne	<u>Tiazydowe:</u> - hydrochlorotiazyd <u>Tiazydopodobne:</u> - indapamid - chlortalidon
Leki blokujące receptory beta – adrenergiczne (beta-blokery)	<u>Wysoce kardioselektywne beta-blokery o działaniu wazodylatacyjnym:</u> - nebiwolol <u>Wysoce kardioselektywne beta -blokery:</u> - bisoprolol - metoprolol <u>Wazodylatacyjne beta -blokery:</u> - karwedilol
Antagoniści wapnia (blokery kanałów wapniowych, CCB)	<u>Pochodne dihydropirydynowe:</u> - amlodypina - lekarnidypina - lacydypina <u>Niedihydropirydynowe blokery:</u> - werapamil - dilitiazem
Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACEI)	- peryndopryl - ramipryl

	- lizynopryl - enalapryl - zofenopryl
Leki blokujące receptor angiotensynowy AT1 (ARB, sartany)	- walsartan - telmisartan - losartan - kandesartan

Dodatkowe grupy leków hipotensyjnych i przykładowe substancje	
Diuretyki pętlowe	- furosemid - torasemid
Alfa - adrenolityki	- doksazosyna - terazosyna - prazosyna
Inhibitory reniny	- aliskiren
Centralne sympatykolytyki	- metyldopa - klonidyna - moksonidyna
Antagoniści aldosteronu	- spironolakton - eplerenon
Obwodowe sympatykolytyki	- dihydralazyna

Na podstawie: 2023 ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension: Endorsed by the International Society of Hypertension (ISH) and the European Renal Association (ERA)