



Tabela. Niedokrwistość z niedoboru żelaza, zakresy norm zależne od wieku

Wiek	Hemoglobina (g/dl)		Hematokryt (%)		Liczba erytrocytów (n/μl)		MCV (fl)		MCH (pg)		MCHC (g/dl krwinek)		RDW-CV (%)		Retikulocyty (%)	Retikulocyty (‰)	Retikulocyty (n/μl)
Płeć	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K			
1-14 dni	13,9-19,1	13,4-20,0	39,8-53,6	39,6-57,2	4 010 000-5 550 000	4 120 000-5 740 000	91,3-103,1	92,7-106,4	31,3-35,6	31,1-35,9	33,0-35,7	33,4-35,4	14,8-17,0	14,6-17,3	3,47-5,40	34,7-54,0	147 500-216 400
15-30 dni	10,0-15,3	10,8-14,6	30,5-45,0	32,0-44,5	3 160 000-4 630 000	3 320 000-4 800 000	89,4-99,7	90,1-103,0	29,9-34,1	30,4-35,3	32,7-35,1	33,2-35,0	14,3-16,8	14,4-16,2	1,06-2,37	10,6-23,7	51 300-110 400
31-60 dni	8,9-12,7	9,2-11,4	26,8-37,5	27,7-35,1	3 020 000-4 220 000	2 930 000-3 870 000	84,3-94,2	83,4-96,4	27,8-32,0	28,0-32,5	32,3-34,8	32,5-34,9	13,8-16,1	13,6-15,8	2,12-3,47	21,2-34,7	51 800-77 900
61-180 dni	9,6-12,4	9,9-12,4	28,6-37,2	29,5-37,1	3 430 000-4 800 000	3 450 000-4 750 000	74,1-87,5	74,8-88,3	24,4-28,9	24,4-29,5	31,9-34,4	32,1-34,4	12,4-15,3	12,2-14,3	1,55-2,70	15,5-27,0	48 200-88 200
od 6 m-cy do <2 lat	10,1-12,5	10,2-12,7	30,8-37,8	30,9-37,9	4 030 000-5 070 000	3 970 000-5 010 000	69,5-81,7	71,3-82,6	22,7-27,2	23,2-27,5	31,6-34,4	31,9-34,2	12,9-15,6	12,7-15,1	0,99-1,82	9,9-18,2	43 500-111 100
2 do <6 lat	10,2-12,7	10,2-12,7	31,0-37,7	31,2-37,8	3 890 000-4 970 000	3 840 000-4 920 000	71,3-84,0	72,3-85,0	23,7-28,3	23,7-28,6	32,0-34,7	31,8-34,6	12,5-14,9	12,4-14,9	0,82-1,45	8,2-14,5	36 400-68 000
6 do <12 lat	10,7-13,4	10,6-13,2	32,2-39,8	32,4-39,5	3 960 000-5 030 000	3 900 000-4 960 000	74,4-86,1	75,9-87,6	24,9-29,2	24,8-29,5	32,2-34,9	31,8-34,6	12,3-14,1	12,2-14,4	0,98-1,94	9,8-19,4	42 400-70 200
12 do <18 lat	11,0-14,5	10,8-13,3	33,9-43,5	33,4-40,4	4 030 000-5 290 000	3 930 000-4 900 000	76,7-89,2	76,9-90,6	25,2-30,2	24,8-30,2	31,8-34,8	31,5-34,2	12,4-14,5	12,3-14,6	0,90-1,49	9,0-14,9	41 600-65 100
≥18 lat	11,9-15,4	10,6-13,5	36,2-46,3	32,9-41,2	4 180 000-5 480 000	3 700 000-4 870 000	80,0-93,6	77,7-93,7	26,5-31,4	25,3-30,9	31,9-34,8	31,0-34,1	12,3-14,3	12,4-15,1	0,86-1,36	8,6-13,6	39 100-57 000

Opracowane na podstawie: Steven J. Soldin, Carlo Brugnara, Edward C. Wong; Pediatric reference intervals; AACCC Press, 2011
M – chłopcy; K – dziewczynki, MCV – średnia objętość krwinek czerwonych, MCH – średnia masa Hb w erytrocyocie, MCHC – średnie stężenie Hb w erytrocytach, RDW-CV – współczynnik zmienności rozkładu objętości krwinek czerwonych