

Możliwe przyczyny omdlenia związane z okolicznościami ich występowania

Czynniki predysponujące lub wyzwalające omdlenie	Prawdopodobna przyczyna
Długie pozostawanie w pozycji stojącej	Omdlenia odruchowe, wazowagalne
Nagła pionizacja	Niedociśnienie ortostatyczne
Podczas wysiłku fizycznego	Zwężenie zastawki aortalnej, nadciśnienie płucne, zwężenie zastawki mitralnej, kardiomiopatia, choroba wieńcowa
Bezpośrednio po wysiłku fizycznym	Omdlenia odruchowe, wazowagalne, przyczyna sercowa (arytmia)
Bezpośrednio po kaszlu, oddawaniu moczu, połykaniu lub po wypróżnieniu	Omdlenia odruchowe, omdlenia sytuacyjne
Spowodowane obrotem głowy, ruchami szyi, naciskiem na zatokę szyjną (nowotwory, golenie, ciasne kołnierzyki)	Odruchowe omdlenia, zespół zatoki szyjnej
W trakcie ćwiczeń/nadwyrężenia kończyny górnej	Zespół podkradania tętnicy podobojczykowej
Przebywanie w ciepłych, zatłoczonych pokojach, niepokój, nieprzyjemne widoki, zapachy lub dźwięki, nagły, niespodziewany ból	Omdlenia odruchowe, omdlenia wazowagalne
Nudności, wymioty, ból brzucha, zamarzanie, pocenie się, niewyraźne widzenie	Omdlenia odruchowe, omdlenia wazowagalne
Toniczno-kloniczne drgawki	Padaczka

Objawy po omdleniu	
Toniczno-kloniczne lub minimalne mioklonie po upadku	Omdlenia odruchowe, omdlenia wazowagalne
Nudności, wymioty, pocenie się	Omdlenia odruchowe, wazowagalne
Natychmiastowy, całkowity powrót do zdrowia	Sercowe (arytmia), zaburzenia psychiczne
Niskie tętno	Bradyarytmia
Nietrzymanie moczu lub kału	Drgawki/padaczka
Ogniskowy deficyt neurologiczny	Neurologiczna przyczyna, TIA
Drgawki, ból głowy, podwójne widzenie, niedowład połowiczny,	Drgawki, migrena, TIA, udar, zespół podkradania tętnicy podobojczykowej
Ból w klatce piersiowej, duszność przed omdleniem	Przyczyny sercowo-naczyniowe (zakrzepica, zawał serca, kardiomiopatia)
Różnica w pomiarze tętna i ciśnienia krwi na kończynach górnych	Zespół podkradania tętnicy podobojczykowej, rozwarstwienie aorty
Choroby współistniejące/leki stosowane/wywiad rodzinny	
Drgawki	Padaczka
Przedłużające się splątanie	Padaczka/drgawki
Cukrzyca	Hipoglikemia
Zespół Parkinsona	niedociśnienie ortostatyczne

Nagły zgon sercowy w rodzinie	Zespół wydłużonego QT, zespół Brugada, kardiomiopatia przerostowa, wada wrodzona serca
Leki przeciwnadciśnieniowe, leki przeciwdławicowe, leki moczopędne	przyczyny sercowo-naczyniowe
Leki przeciwdepresyjne	Omdlenie odruchowe
Leki antyarytmiczne lub leki wydłużające odstęp QT	Arytmia
Długi wywiad w kierunku częstych omdleń	Zaburzenia psychiczne, wazowagalne

Źródło: Gauer RL. Evaluation of syncope Fam Physician 2011; 84: 640-50.