

Klasyfikacja ostrego niedokrwienia kończyn według Rutherforda

Stopień	Zaburzenia czucia	Deficyt motoryczny	Sygnał dopplerowski	Rokowanie
I	Brak	Brak	Wykrywalne sygnały tętnicze i żyłne	Brak bezpośredniego zagrożenia
IIa	Brak lub minimalne (np. w obszarze palców)	Brak	Sygnał tętniczy często niewykrywalny Sygnał żylny wykrywalny	Możliwe uratowanie kończyny pod warunkiem natychmiastowego leczenia
IIb	Na obszarze większym niż palce u nóg Ból spoczynkowy	Łagodny/umiarkowany	Sygnał tętniczy zwykle niewykrywalny Sygnał żylny wykrywalny	Możliwe uratowanie kończyny pod warunkiem natychmiastowej rewaskularyzacji
III	Głębokie	Głęboki paraliż, zeszywnienie	Sygnały tętnicze i żyłne niewykrywalne	Nieodwracalne uszkodzenie tkanki i/lub nerwów

Źródło: Rutherford RB, Baker JD, Ernst C, Johnston KW, Porter JM, Ahn S, Jones DN (1997) Zalecane standardy dla raportów dotyczących niedokrwienia kończyn dolnych: wersja poprawiona. J Vasc Surg 26:517–538.