



Leczenie farmakologiczne stabilnej POChP

Stopień	Leczenie	Alternatywa
A	Lek rozszerzający oskrzela	Teofilina
B	LAMA + LABA	SABA i/lub teofilina SAMA
E	LAMA + LABA (u chorych z liczbą eozynofilów $\geq 300/\mu\text{l}$ rozważyć LABA + LAMA + ICSw)	SABA i/lub teofilina SAMA

LAMA = długo działający lek przeciwcholinergiczny

LABA = długo działający beta-agonista

ICSw = wziewny kortykosteroid

Źródło: Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease: Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. 2023 Report. <https://www.goldcopd.org/2023-gold-report-2/> (dostęp 3.01.2023).

Chorzy z dusznością mimo leczenia

Dotychczasowe leczenie		Zalecane postępowanie
LABA albo LAMA	➔	LABA + LAMA
LABA + LAMA	➔	– rozważyć zmianę rodzaju inhalatora lub stosowanego leku – poszukiwać innych przyczyn duszności i wdrożyć odpowiednie leczenie – wdrożyć lub zintensyfikować postępowanie niefarmakologiczne
Zmiany w stosunku do raportu z 2022 r.: – usunięto sugestię rozważenia powrotu do stosowania 1 leku rozkurczającego oskrzela – usunięto opcję stosowania preparatów złożonych zawierających GKSw u chorych z dusznością, ale bez zaostrzeń – dodano zalecenie dotyczące postępowania niefarmakologicznego		

Chorzy z zaostrzeniami mimo leczenia

Dotychczasowe leczenie		Zalecane postępowanie
LABA albo LAMA	➔	liczba eozynofilów $<300/\mu\text{l}$ → LABA + LAMA albo liczba eozynofilów $\geq 300/\mu\text{l}$ → LABA + LAMA + GKSw
LABA + LAMA	➔	liczba eozynofilów $\geq 100/\mu\text{l}$ → LABA + LAMA + GKSw liczba eozynofilów $<100/\mu\text{l}$ → roflumilast (u chorych z $\text{FEV}_1 < 50\%$ i przewlekłym kaszlem z odkrztuszaniem) albo azytromycyna (u byłych palaczy)
LABA + LAMA + GKSw	➔	roflumilast (u chorych $\text{FEV}_1 < 50\%$ i przewlekłym kaszlem z odkrztuszaniem) albo azytromycyna (u byłych palaczy) albo LABA + LAMA (rozważyć w przypadku zapalenia płuc lub innych istotnych skutków niepożądanych stosowania GKSw; u chorych z eozynofilią $\geq 300/\mu\text{l}$ większe ryzyko zaostrzeń po odstawieniu GKSw)
Zmiany w stosunku do raportu z 2022 r.: – usunięto opcję stosowania preparatów złożonych zawierających LABA i GKSw		

FEV_1 – natężona objętość wydechowa pierwszosekundowa, GKSw – glikokortykosteroid wziewny, LABA – długo działający $\beta 2$ -mimetyk, LAMA – długo działający lek przeciwcholinergiczny