

Schemat obserwacji odległej																
Rok			1				2				3			4		5
Czas od zakończenia leczenia (miesiące)	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	42	48	54	60
Badanie przedmiotowe	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Oznaczenie antygenu CEA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Badania obrazowe jamy brzusznej/ Miednicy <sup>1</sup>				X				X				X		X		X
Badania obrazowe klatki piersiowej <sup>2</sup>				X				X				X		X		X
Kolonoskopia	X <sup>3</sup>			X										X		

Źródło: Potemski P., Bujko K., Rutkowski A., Krzakowski M.. Wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych na raka okrężnicy (C18) i zagięcia esiczo-odbytniczego (C19). Onkol Prakt Klin Edu 2020;6(4):246-257

<sup>1</sup> Preferowane badanie TK, dopuszczalne USG. W przypadku elewacji stężenia CEA zawsze TK z kontrastem i.w.

<sup>2</sup> Preferowane badanie TK, dopuszczalne USG. W przypadku elewacji stężenia CEA zawsze TK z kontrastem i.w.

<sup>3</sup> Tylko wówczas, gdy wykonanie pełnej kolonoskopii przed operacją nie było możliwe