

Różnicowanie PAD od neuropatii (badanie kliniczne)

	Neuropatia	PAD
Skóra	Sucha, ciepła, różowa, wypełnienie żył nawet przy wysokości 30° bez zmiany koloru	Zanikowa, cienka, chłodna, jasnobłada, blada w przedniej części stopy po jej uniesieniu
Obrzęki	Często wykrywalne	Rzadko
Nadmierne rogowacenie	Wyraźne w obszarach narażonych na ciśnienie, pęknięcia w obszarze pięty	Spowolniony wzrost skóry, nadmierne rogowacenie podobne do papieru ściernego
Paznokcie	Grzybice, krwiaki podpaznokciowe	Pogrubiałe, stwardniałe, oddzielające się od palca
Palce	Pazury/palce młotkowate, odciski	Zanik owłosienia, wiotkie, zmiany na powierzchni podeszwowej
Mięśnie	Zanik mięśni międzykostnych	Ogólny zanik mięśni
Podeszwa	Hiperkeratoza, głębokie linijne pęknięcia, odleżyny	Wygładzenie fałdów skórnych

Źródło: Niemieckie Towarzystwo Angiologii – Towarzystwo Medycyny Naczyniowej Choroba okluzyjna tętnic obwodowych (PAD), diagnostyka, terapia i opieka pooperacyjna. Wytuczna AWMF nr 065–003, stan na 30.09.2015, s. 28