

Zespół niewydolności oddechowej u dorosłych – kryteria diagnostyczne

ARDS – definicja berlińska		
Początek	W ciągu jednego tygodnia od wystąpienia ostrego zdarzenia lub nowych lub nasilających się objawów ze strony układu oddechowego.	
Badania obrazowe(RTG klatki piersiowej lub TK klatki piersiowej)	Obustronne zagęszczenia, zacienienia, których nie można wyjaśnić samym wysiękiem, odłą opłucnową lub guzkami.	
Przyczyna obrzęku	Niewydolności oddechowej nie można wytłumaczyć samą ostrą niewydolnością serca lub przeciążeniem objętościowym (w przypadku braku czynników ryzyka obrzęku hydrostatycznego przyczynę sercową należy wykluczyć za pomocą echokardiografii).	
Natlenienie (3 stopnie nasilenia)	Łagodny	$200 \text{ mmHg} < \text{PaO}_2/\text{FIO}_2 \leq 300 \text{ mmHg}$ i $\text{PEEP}/\text{CPAP} \geq 5 \text{ cm H}_2\text{O}$
	Umiarkowany	$100 \text{ mmHg} < \text{PaO}_2/\text{FIO}_2 \leq 200 \text{ mmHg}$ i $\text{PEEP} \geq 5 \text{ cm H}_2\text{O}$
	Ciężki	$\text{PaO}_2/\text{FIO}_2 \leq 100 \text{ mmHg}$ i $\text{PEEP} \geq 5 \text{ cm H}_2\text{O}$

Źródło: ARDS Definition Task Force, Ranieri VM, Rubenfeld GD, Thompson BT, Ferguson ND, Caldwell E, Fan E, Camporota L, Slutsky AS. Zespół ostrej niewydolności oddechowej: definicja berlińska. JAMA 2012; 307(23): 2526-33.